

Dosi e modalità d'impiego

Può essere distribuito su qualsiasi coltura, sia per concimazioni di mantenimento che di arricchimento.

COLTURE	Periodo e modalità di applicazione	DOSAGGIO
Piante da frutto	In post-raccolta (autunno) e/o prima della ripresa vegetativa (inverno) frazionando la quantità complessiva.	300-600 kg/ha
Ortaggi in serra	in pre-semina o pre-trapianto	40 - 70 kg / 1000 m ²
Colture industriali ed estensive	in pre-semina o pre-trapianto	300-600 kg/ha
Tappeti erbosi	distribuire a fine inverno, inizio estate e in autunno (da 2 a 4 applicazioni/anno).	40 - 70 kg / 1000 m ²



GRANVERDE OM

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (S) 6-6-14 (15)

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	1%
Azoto (N) nitrico	1%
Azoto (N) ammoniacale	4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	6%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	6%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	14%
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	15%
Carbonio (C) organico di origine biologica	7,5%

CONFEZIONE: 25 kg